

ویتئوفا®

شیاف واژینال / رکتال ویتامین E
(فرآورده طبیعی)

اطلاعات تکمیلی

شکل دارویی: شیاف

بسته‌بندی: ۲۱ عدد در بسته (۷×۳)

شرایط نگهداری:



در یخچال (در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد)
نگهداری گردد.

روش مصرف واژینال

- دست‌ها را با آب و صابون بشوید.
- در حالت درازکش به پشت قرار بگیرید و زانوها را خم کنید.
- شیاف را به آرامی در عمق حدود ۲-۳ سانتی‌متر داخل واژن قرار دهید.
- بهترین زمان مصرف، شب قبل از خواب است.
- پس از قرار دادن، حداقل ۱۰ دقیقه در همین حالت بمانید تا جذب کامل شود.
- نکات مهم:
- در دوران قاعدگی مصرف فقط با نظر پزشک ادامه یابد.
- در بارداری یا سابقه حساسیت پوستی، پیش از مصرف با پزشک مشورت کنید.
- در صورت احساس سوزش یا ترشح غیرطبیعی، مصرف را قطع نمایید.

روش مصرف رکتال

- دست‌ها را با آب و صابون بشوید.
- دراز بکشید و به پهلو برگردید تا عضلات مقعد شل شوند.
- شیاف را با نوک انگشت تمیز به آهستگی در عمق ۲-۳ سانتی‌متر وارد کنید.
- پس از مصرف، ۱۵-۲۰ دقیقه در همان وضعیت باقی بمانید.
- نکات مهم:
- در صورت تحریک یا درد، مصرف را متوقف کرده و به پزشک اطلاع دهید.





Vitivia[®]

Vitamin E Suppository

(Natural product)

Additional Information

Dosage form: Suppository

Packaging: 21 units per pack (7 × 3)

Storage conditions:


Store in refrigerator (2–8°C).
Keep out of reach of children.

Vaginal Administration Instructions

- Wash your hands thoroughly with soap and water.
- Lie on your back with your knees bent.
- Gently insert the suppository about 2–3 cm deep into the vagina.
- The best time for administration is at night before bedtime.
- After insertion, remain lying down for at least 10 minutes to allow full absorption.

Important Notes:

- During menstruation, continue using only with your physician's advice.
- If you are pregnant or have a history of skin sensitivity, consult your doctor before use.
- If you experience burning sensation or abnormal discharge, discontinue use.



Rectal Administration Instructions

- Wash your hands thoroughly with soap and water.
- Lie down on your side to help relax the rectal muscles.
- Using a clean fingertip, gently insert the suppository about 2–3 cm deep into the rectum.
- After insertion, remain in the same position for about 15 minutes.

Important Notes:

- If irritation or pain occurs, stop using and inform your doctor.

